

Budeson Nebu[®]

Budesonida 1 mg/ml

Gotas Para Nebulizar

Venta bajo receta. Industria Argentina

AGITAR ANTES DE USAR

Fórmula cualicuantitativa

Cada 100 ml contiene:

Budesonida 100 mg.

Excipientes: cloruro de benzalconio; polisorbato 80; agua purificada c.s.

Acción terapéutica

Antialérgico, antiinflamatorio.

ACCION FARMACOLOGICA

Disminuye la degranulación de células que producen la respuesta inflamatoria.

INDICACIONES

Asma bronquial crónica.

POSOLOGIA

Dosis inicial (Dosis máximas y mínimas):

ADULTOS: 18 a 36 gotas (1000 µg - 2000 µg) nebulizados dos veces por día.

NIÑOS MAYORES DE 3 MESES: 9 a 18 gotas (500 µg - 1000 µg) nebulizados dos veces por día.

Dosis de mantenimiento (Dosis máximas y mínimas):

ADULTOS: 9 a 18 gotas (500 µg - 1 000 µg) nebulizados dos veces por día.

NIÑOS MAYORES DE 3 MESES: 5 a 9 gotas (250 µg - 500 µg) nebulizados dos veces por día.

El médico indicará al paciente la dosis a utilizar en cada caso particular.

TECNICA DE ADMINISTRACION

Administrar este producto con un nebulizador, utilizando máscara buconasal o aplicador bucal.

INSTRUCCIONES:

- Lavar cuidadosamente la ampolla de nebulización con agua caliente y escurrir los restos de agua de su interior.
- Agitar el frasco gotero e introducir en la ampolla la cantidad de gotas a nebulizar.
- Agregar gotas de solución diluyente para completar el volumen a nebulizar (aproximadamente 2ml) de acuerdo a la siguiente tabla:

Gotas de Budeson Nebu[®]	Gotas de solución diluyente a agregar
5	35
9	30
18	20
36	-

En este volumen, el tiempo de nebulización hasta agotar el contenido de la ampolla es de 10 a 12 minutos.

- Conectar el nebulizador, aplicar la máscara, o introducir en la boca la boquilla, y respirar un poco más profundo que lo habitual, tomar aire por la boca y expulsarlo por la boca y nariz. Si se percibe cansancio, apagar el nebulizador y reiniciar la aplicación tras un breve intervalo de 2 ó 3 minutos.

- La nebulización termina cuando se agota el contenido de la ampolla. Lavar cuidadosamente la misma.

ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS

Ocasionalmente ronquera y/o candidiasis bucofaringea.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Suspender el tratamiento y consultar al médico ante sospecha o evidencia de infección de vías respiratorias. El uso durante el período de embarazo o lactancia queda a criterio del médico tratante.

AGITAR ANTES DE USAR

Es conveniente realizar las nebulizaciones antes de las comidas o bien lavarse cuidadosamente los dientes y enjuagar la boca después de cada nebulización.

Lavar cuidadosamente las manos antes de preparar la nebulización. Tapar el envase del medicamento después de usarlo.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Sólo pueden producirse cuando la medicación se administra en forma prolongada y en dosis mayores a las recomendadas y son:

antiinflamatorios, alcohol, anfotericina B parenteral, inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos, suplementos de potasio, anticoagulantes, antidiabéticos orales o insulina, glicósidos digitálicos, salicilatos, somatropina y estreptoamicina.

PRESENTACION

Budeson Nebu® gotas: envase con 20 ml.

Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 45.750.

Dirección Técnica: Farm. Sergio Omar Berrueta.

Elaborado en:

EUROFARMA ARGENTINA S.A.

Avda. Gral. San Martín 4550, La Tablada.

C.P.: B1751AAP. Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54-11) 4003-6400.

Fecha de última revisión: noviembre 1996.