

## PROYECTO DE PROSPECTO

**NENE DENT NF**  
**TINTURA DE MANZANILLA 150 mg**  
**LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 3,40 mg**  
**POLIDOCANOL 3,20 mg**  
**GEL**

Venta Libre  
Industria Argentina

### **LEA ATENTAMENTE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO:**

#### **¿Qué contiene NENE DENT NF Gel?**

##### **FÓRMULA**

Cada gramo de gel contiene:

Tintura de manzanilla 150,00 mg, Lidocaína clorhidrato 3,40 mg, Polidocanol 3,20 mg.

Excipientes: propilenglicol, xilitol, edetato disódico, sorbitol 70%, carbopol (974 P), polisorbato 20, sacarina sódica, mentol, hidróxido de sodio, agua purificada c.s.p.1 gramo

##### **ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Es un anestésico local y analgésico de uso tópico.

#### **¿Para qué se usa NENE DENT NF GEL?**

Se usa en encías de niños de más de 4 meses, para aliviar las molestias causadas por la dentición.

#### **¿Cómo usar este medicamento y cuánto utilizar?**

**NENE DENT NF GEL es un preparado para uso local para ser empleado exclusivamente en las encías para eliminar las molestias de la dentición (crecimiento de los dientes).**

- 1- El producto debe aplicarse después de alimentar al niño, no se debe aplicar antes de ingerir alimentos o bebidas.
- 2- Lave sus manos antes de aplicar el producto.
- 3- Sobre la yema de su dedo índice coloque una pequeña cantidad equivalente al tamaño de una lenteja)
- 4- Aplique con un masaje suave sobre la encía en el sitio de crecimiento del diente.

Puede aplicar esta dosis hasta 5 veces al día. No aplicar previo a la alimentación porque puede tener dificultad para tragar.

El tratamiento puede continuarse hasta que salgan todos los dientes de leche incluyendo las muelas.

#### **¿Qué debo hacer si la inflamación empeora?**

Si los síntomas (dolor, inflamación de las encías) empeoran, consulte a su médico.

#### **¿Qué personas no pueden usar NENE DENT NF GEL?**

Este medicamento no debe utilizarse si:

- Usted sabe que es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula.
- En niños menores de 4 meses.
- Niños que están siendo tratados por otra enfermedad
- Si la encía se encuentra lastimada (ampollas, llagas)

#### **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?**

Interrumpa el uso y consulte con el médico si:

- Empeora el cuadro con incremento de la inflamación o las molestias

Presenta alguna reacción alérgica

**¿Si estoy recibiendo otra medicación que cuidados debo tener?**

No se han descripto hasta el presente.

**¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

**Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247**

**Hospital Dr. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.**

**Hospital General de Agudos J.A. Fernández: (011) 4808-2655**

**Centro de Asistencia Toxicológico La Plata: (0221) 451-5555**

Optativamente con otros Centros de Intoxicaciones.

**CÓDIGO ATC: NO1BX**

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

**PRESENTACIONES:** Tubo con 10 g

**CONSEVACIÓN:** Conservar al abrigo de la luz, temperatura ambiente hasta 25°C.

Elaborado en: Coronel Méndez 438/40, Wilde, Provincia de Buenos Aires, Argentina  
y/o Avda. Gral. San Martín 4550, La Tablada. C.P.: B1751AAP. Provincia de Buenos  
Aires, Argentina.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud Certificado N° 52.483.

Dirección Técnica: Farm. Sergio Berrueta.

Fecha de la última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 21 Junio 2018  
(Disp N° 6400/18)

Si este medicamento le produjo algún **EFFECTO ADVERSO / INDESEADO** o **NO CAUSÓ  
EFFECTO**, comuníquese con el ANMAT mediante el FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN  
ONLINE disponible en <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificanasp>