

Motid[®]

Bromuro de Otilonio 40 mg

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Venta bajo receta Industria argentina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento, contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento ha sido prescrito sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si observa cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico

Contenido del prospecto:

1. ¿Qué es MOTID[®] y para qué se utiliza?
2. ¿Que contiene MOTID[®]?
3. Antes de usar MOTID[®]
4. ¿Cómo usar MOTID[®]?
5. Posibles efectos adversos
6. Conservación de MOTID[®]
7. Información adicional

1. ¿Qué es MOTID[®] y para qué se utiliza?

MOTID[®] pertenece a un grupo de medicamentos que actúan disminuyendo las contracciones del intestino y se utiliza para el tratamiento de los espasmos (contracciones) en adultos y niños mayores de 12 años de edad, especialmente en el síndrome del colon irritable (trastorno del intestino que produce dolor o molestia abdominal, estreñimiento o diarrea).

No usar para el cólico infantil (llanto intenso y prolongado en los primeros meses de vida).

2. ¿QUE CONTIENE MOTID[®]?

El principio activo es Bromuro de Otilonio. Cada comprimido recubierto contiene: Bromuro de Otilonio 40 mg. *Excipientes:* Croscarmelosa sódica 10,0 mg, celulosa microcristalina PH 200 113,5 mg, almidón de maíz 5,0 mg, estearato de magnesio 1,5 mg, opadry white 5,0 mg.

3. ANTES DE USAR MOTID[®]

No use MOTID[®]:

- Si es alérgico (hipersensible) a Bromuro de Otilonio, o a cualquiera de los demás componentes de MOTID[®].
- Si tiene obstrucción intestinal (ocurre cuando la comida o heces no pueden salir del intestino)

Tenga especial cuidado con MOTID®:

Este medicamento es solo para adultos y niños mayores de 12 años. Consulte a su médico si este medicamento se ha prescrito a un niño menor de 12 años.

Antes del tratamiento con MOTID® informe a su médico si alguna de las siguientes situaciones le afecta:

- Es un paciente de edad avanzada
- Tiene glaucoma (aumento de la presión en el ojo)
- Tiene hipertrofia de próstata (agrandamiento de la próstata)
- Tiene estenosis pilórica (dificultad en el paso del contenido del estómago al intestino)
- Tiene problemas de hígado o riñón
- Tiene problemas de corazón como taquicardia (aumento del ritmo cardiaco)
- Tiene hipertiroidismo (alteración de la glándula tiroides con aumento de hormonas tiroideas)
- Tiene colitis ulcerosa (enfermedad inflamatoria del intestino)
- Tiene reflujo esofágico (paso del contenido del estómago al esófago).

Uso de otros medicamentos

Antes del tratamiento con MOTID® informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta; incluso si está tomando medicamentos a base de plantas medicinales o vitaminas y minerales fuertes.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Su médico decidirá si puede tomar MOTID® durante este periodo.

No se aconseja tomar MOTID® durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

No se han observado efectos en la conducción y uso de máquinas con el uso de MOTID®.

4. ¿Cómo usar MOTID®?

Los comprimidos recubiertos deben tomarse aproximadamente 20 minutos antes de las comidas, con medio vaso de agua.

Tome un comprimido recubierto 2 a 3 veces al día.

La duración máxima del tratamiento es de 4 semanas.

En caso de reaparición de la sintomatología dolorosa, el médico deberá evaluar la conveniencia de instaurar un nuevo tratamiento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico o farmacéutico.

Si omitió una dosis de MOTID®

Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. No obstante, si falta poco tiempo para su siguiente toma, no tome la dosis que olvidó. No tome una dosis doble (dos dosis a la vez) para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con MOTID®

No deje de usar el medicamento sin consultar a su médico. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico o farmacéutico.

5. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, MOTID® puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Su médico le informará de los posibles efectos adversos, y le explicará los riesgos y beneficios de su tratamiento. Algunos de estos efectos adversos se deben tratar inmediatamente, ver también la información en la sección “Tenga especial cuidado con MOTID®”.

A la dosis recomendada, MOTID® es generalmente bien tolerado. Eventualmente puede causar en las personas sensibles un ligero cansancio, náuseas o ardor de estómago.

A dosis mayores a la recomendada, MOTID® puede producir sequedad de mucosas, dificultad para orinar, constipación, visión borrosa.

Efectos adversos de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Dolor de cabeza, vómitos, urticaria, vértigo, fatiga.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

6. Conservación de MOTID®

Conservar a temperatura ambiente inferior a los 30°C, dentro de su envase original.

7. Información adicional

¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

Si ingiere una sobredosis de MOTID® consulte al médico que le administra el medicamento y concurra al hospital más cercano o comuníquese con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (01) 4962-6666/2247.

Hospital Nacional Dr. A. Posadas: (01) 4654-6648/4658-7777.

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

Presentaciones

Envases conteniendo 20 y 40 comprimidos recubiertos.

“ESTE MEDICAMENTO HA SIDO PRESCRIPTO SÓLO PARA SU PROBLEMA MÉDICO ACTUAL. NO LO RECOMIENDE A OTRAS PERSONAS.”

“ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Modo de conservación y almacenamiento

Conservar a temperatura ambiente inferior a los 30°C, dentro de su envase original.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 52.843.

Dirección Técnica: Farm. Sergio Omar Berrueta

EUROFARMA ARGENTINA S.A

Avda. Gral San Martín 4550, La Tablada. Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Tel: (54-11) 4003-6400.

Fecha de última revisión: diciembre 2017

Disposición ANMAT N° DI-2017-12258-APN-ANMAT#MS