

PIXAR®

APIXABAN 2,5 – 5,0mg

Comprimidos recubiertos

VENTA BAJO RECETA - INDUSTRIA ARGENTINA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas"

COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto de **PIXAR®** 2,5 mg contiene:

Apixaban 2,50 mg. Excipientes: Celulosa lactosa (Cellactose 80)* 91,50 mg, Croscarmelosa sódica (AC-DI-SOL) 4,00 mg, Lauril sulfato de sodio 1,00 mg, Estearato de Magnesio no bovino (M 5712) 1,00 mg, Opadry Y-1-18128-A White** 2,85 mg, Óxido de hierro amarillo 0,15 mg, agua purificada csp. *Lactosa Monohidrato 68,6 mg, Celulosa en polvo 22,9 mg **Hipromelosa 1,75 mg, Dióxido de titanio 0,84 mg, Triacetina 0,26 mg.

Cada comprimido recubierto de **PIXAR®** 5,0 mg contiene:

Apixaban 5,00 mg. Excipientes: Celulosa lactosa (Cellactose 80)* 183,00 mg, Croscarmelosa sódica (AC-DI-SOL) 8,00 mg, Lauril sulfato de sodio 2,00 mg, Estearato de Magnesio no bovino (M 5712) 2,00 mg, Opadry Y-1-18128-A White** 5,94 mg, Óxido de hierro rojo 0,06mg, agua purificada csp. *Lactosa Monohidrato 137,2 mg, Celulosa en polvo 45,8 mg **Hipromelosa 3,65 mg, Dióxido de titanio 1,75 mg, Triacetina 0,54 mg.

¿QUÉ ES PIXAR® Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

PIXAR® contiene el principio activo apixaban y pertenece a un grupo de medicamentos llamados anticoagulantes. Este medicamento ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre al bloquear el Factor Xa, un elemento importante de la coagulación de la sangre.

PIXAR® se usa en adultos:

- para prevenir la formación de coágulos de sangre (trombosis venosa profunda [TVP]) después de una operación de reemplazo de cadera o rodilla. Después de una operación de cadera o rodilla usted puede tener un mayor riesgo de que se le formen coágulos de sangre en las venas de las piernas. Esto puede causar hinchazón en las piernas, con o sin dolor. Si un coágulo de sangre viaja de la pierna a sus pulmones, puede impedir el flujo de sangre, causando dificultad para respirar, con o sin dolor de pecho. Esta condición médica (embolismo pulmonar) supone un riesgo para su vida y requiere atención médica inmediata.
- para prevenir la formación de un coágulo sanguíneo en el corazón en pacientes con un latido irregular del corazón (fibrilación auricular) y al menos un factor de riesgo adicional. Los coágulos sanguíneos se pueden desprender, moverse hasta el cerebro y provocar un accidente cerebrovascular (ACV), o moverse a otros órganos evitando una correcta irrigación del mismo (también conocida como embolia sistémica). Un accidente cerebrovascular puede tener riesgo para la vida y requiere atención médica inmediata.
- para tratar coágulos de sangre en las venas de las piernas (trombosis venosa profunda) y en los vasos sanguíneos de los pulmones (embolia pulmonar), y para prevenir que estos coágulos de sangre vuelvan a aparecer en los vasos sanguíneos de las piernas y/o de los pulmones.

¿QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR PIXAR® ?

No tome **PIXAR®**

- si es alérgico a apixaban o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento

- si sangra excesivamente o más de lo esperado
- si tiene una enfermedad en un órgano del cuerpo que aumente el riesgo de sangrado grave (como una úlcera activa o reciente del estómago o intestino, o hemorragia cerebral reciente)
- si padece una enfermedad del hígado que aumente el riesgo de sangrado (coagulopatía hepática)
- si está tomando medicamentos para prevenir la coagulación de la sangre (por ejemplo, warfarina, rivaroxaban, dabigatrán o heparina), excepto cuando cambie de tratamiento anticoagulante, mientras tenga una vía arterial o venosa y sea tratado con heparina para mantener esa vía abierta, o cuando se le inserte un tubo en un vaso sanguíneo (ablación por catéter) para tratar un ritmo cardíaco irregular (arritmia).

Advertencias y precauciones

Antes de prescribirle este medicamento, su médico evaluará su riesgo individual de presentar un accidente cerebrovascular, así como de presentar algún sangrado.

Informe a su médico antes de tomar este medicamento si presenta alguna de estas situaciones:

- un riesgo aumentado de sangrado como, por ejemplo:
 - trastornos hemorrágicos, incluyendo situaciones que resulten en una disminución de la actividad plaquetaria
 - presión arterial muy alta, no controlada con tratamiento médico
 - es usted mayor de 75 años
 - pesa usted 60 kg o menos
- una enfermedad renal grave o si está sometido a diálisis
- un problema del hígado o historial de problemas del hígado
- tuvo un catéter o recibió una inyección en la columna vertebral (para anestesia o alivio del dolor) Su médico le indicará que deje pasar un mínimo de 5 horas después de retirar el catéter antes de tomar PIXAR®
- lleva una prótesis valvular cardíaca
- si su médico determina que su presión arterial es Inestable o tiene previsto recibir otro tratamiento o ser sometido a una cirugía para extraer el coágulo de sangre de sus pulmones.

Tenga especial cuidado:

- Si sabe que padece una enfermedad denominada síndrome antifosfolípido (un trastorno del sistema inmunitario que aumenta el riesgo de que se formen coágulos de sangre), informe a su médico para que modifique su tratamiento.
- PIXAR® se utilizará con precaución en pacientes con alteraciones en la función del hígado. PIXAR® debe usarse con precaución si usted presenta alguna condición que tenga un riesgo mayor de hemorragia. En caso de presentar hemorragia, debe suspender el medicamento y comunicarse inmediatamente con su médico.

Es muy importante que usted cumpla el tratamiento con PIXAR® siguiendo las indicaciones prescritas por su médico con el fin de evitar posibles complicaciones.

Es necesario que antes de realizarse cualquier cirugía o procedimiento médico u odontológico, usted informe a otros médicos, enfermeros, dentistas, farmacéuticos o cualquier personal de salud, que está tomando PIXAR®. Si necesita una intervención quirúrgica o un procedimiento que pueda provocar un sangrado, su médico le indicará suspender temporalmente la toma de este medicamento durante un tiempo. Si no está seguro si una intervención puede provocar un sangrado, consulte a su médico.

Las inyecciones intramusculares (aplicadas en el glúteo, hombro o muslo) pueden causar la aparición de hematomas en el sitio de la inyección en pacientes que reciben tratamiento con PIXAR®, por lo cual debe advertir previamente que está recibiendo este medicamento y evitar este tipo de inyecciones. Las inyecciones subcutáneas (justo debajo de la piel) e intravenosas, por otra parte, no conducen a estas complicaciones.

Aún no existe un antídoto para PIXAR®, por lo cual es necesario que su médico evalúe continuamente el cumplimiento de su tratamiento, así como la necesidad de ajustar o interrumpir el mismo en determinadas situaciones como, por ejemplo, aparición de sangrados u otro efecto adverso, realización de cirugías, ajuste de dosis por cambios en el funcionamiento de sus riñones, posibles cambios en el efecto de PIXAR® debido al uso de otros medicamentos, necesidad de cambiar el tipo de anticoagulante, etc.

Niños y adolescentes

No se recomienda el uso de PIXAR® en niños y adolescentes menores de 18 años de edad.

Uso de PIXAR® con otros medicamentos.

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar otros medicamentos.

Algunos medicamentos pueden aumentar los efectos de APIXA

® y algunos medicamentos pueden disminuir sus efectos. Su médico decidirá si debe ser tratado con PIXAR® si está tomando estos medicamentos y si debe mantenerse bajo observación más estrecha.

Los siguientes medicamentos pueden aumentar los efectos de PIXAR® e incrementar la posibilidad de una hemorragia no deseada:

- algunos medicamentos para las infecciones fúngicas (por ejemplo, ketoconazol, etc.)
- algunos medicamentos antivirales para el VIH / SIDA (por ejemplo, ritonavir)
- otros medicamentos para reducir la coagulación de la sangre (por ejemplo, enoxaparina, etc.)
- antiinflamatorios o medicamentos para aliviar el dolor (por ejemplo, ácido acetilsalicílico o naproxeno). En especial si es usted mayor de 75 años y toma ácido acetilsalicílico, existe una mayor probabilidad de sufrir sangrado.
- medicamentos para la presión arterial alta o problemas de corazón (por ejemplo, diltiazem)
- medicamentos antidepresivos de la clase de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina.

Los siguientes medicamentos pueden reducir la capacidad de PIXAR® de prevenir la formación de coágulos de sangre

- medicamentos para el tratamiento de la epilepsia o convulsiones (por ejemplo, fenitoína, etc.)
- hierba de San Juan (hipérico- un medicamento a base de plantas para el tratamiento de la depresión)
- medicamentos para tratar la tuberculosis u otras infecciones (por ejemplo, rifampicina)

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Se desconocen los efectos de PIXAR® sobre el embarazo y el feto. No debe tomar PIXAR® si está embarazada. Informe inmediatamente a su médico si queda embarazada mientras toma PIXAR® .

Se desconoce si PIXAR® se excreta en la leche humana. Pregunte a su médico antes de tomar este medicamento durante la lactancia. Ellos le indicarán si debe interrumpir la lactancia o dejar de tomar o no empezar a tomar PIXAR® .

Conducción y uso de máquinas

PIXAR® no tiene ninguna influencia sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

PIXAR® contiene lactosa (un tipo de azúcar) y sodio.

Si su médico le ha dicho que tiene una intolerancia a ciertos azúcares, hable con él antes de tomar este medicamento.

Este medicamento contiene menos de 1mmol de sodio (23 mg) por comprimido, que equivale a la condición "libre de sodio"

¿CÓMO TOMAR PIXAR® ?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte a su médico.

Dosis

Tome el comprimido con agua. PIXAR® puede tomarse con o sin alimentos.

Si tiene dificultad para ingerir el comprimido entero, hable con su médico sobre otras posibles formas de tomar PIXAR® .

El comprimido se puede triturar y mezclar con agua, glucosa al 5% en agua, jugo de manzana o puré de manzana inmediatamente antes de tomarlo.

Trate de tomar los comprimidos a la misma hora cada día para conseguir un mejor efecto del tratamiento.

Instrucciones para triturar:

- Triturar los comprimidos con un mortero.

- Transferir todo el polvo cuidadosamente en un recipiente adecuado, mezclando el polvo con una pequeña cantidad, por ejemplo, 30 ml (2 cucharadas), de agua o cualquiera de los líquidos mencionados para hacer la mezcla.
- Ingerir la mezcla.
- Enjuagar el mortero y mano del mortero que se han utilizado para triturar el comprimido y el envase, con una pequeña cantidad de agua o uno de los líquidos {por ejemplo 30 ml), e ingerir ese líquido.

Si fuera necesario, su médico también podría administrarle el comprimido triturado de PIXAR® mezclado en 60 ml de agua o glucosa al 5% en agua, a través de una sonda nasogástrica.

Tome PIXAR® de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

Para prevenir la formación de coágulos de sangre en operaciones de sustitución de cadera o rodilla.

La dosis recomendada de PIXAR® es de un comprimido de PIXAR® 2,5 mg dos veces al día.

Por ejemplo, tome un comprimido por la mañana y otro por la noche. Trate de tomar los comprimidos a la misma hora cada día para conseguir un mejor efecto del tratamiento.

Debe tomar el primer comprimido entre 12 a 24 horas después de la operación.

si se ha sometido a una cirugía mayor de cadera, generalmente tomará los comprimidos durante un período de 32 a 38 días.

si se ha sometido a una cirugía mayor de rodilla, generalmente tomará los comprimidos durante un período de 10 a 14 días.

Para prevenir la formación de un coágulo de sangre en el corazón en los pacientes con un latido irregular del corazón y al menos un factor de riesgo adicional.

La dosis recomendada de PIXAR® es de un comprimido de PIXAR® 5 mg dos veces al día

La dosis recomendada de PIXAR® es de un comprimido de PIXAR® 2,5 mg dos veces al día si:

- tiene la función renal gravemente disminuida
- tiene dos o más de los siguientes factores:
 - o sus resultados de los análisis de sangre sugieren un deficiente funcionamiento del riñón (el valor de creatinina sérica es de 1,5 mg/dl (133 micromoles/l) o superior)
 - o tiene una edad igual o superior a 80 años - su peso es igual o inferior a 60 kg

La dosis recomendada es un comprimido dos veces al día; por ejemplo, un comprimido por la mañana y un comprimido por la noche.

Para tratar los coágulos de sangre en las venas de las piernas y en los vasos sanguíneos de los pulmones:

La dosis recomendada es de dos comprimidos de PIXAR® 5 mg dos veces al día durante los primeros 7 días, por ejemplo, dos comprimidos por la mañana y dos comprimidos por la noche.

Después de 7 días la dosis recomendada es de un comprimido de PIXAR® 5 mg dos veces al día, por ejemplo, un comprimido por la mañana y otro por la noche.

Para prevenir que los coágulos de sangre vuelvan a producirse después de 6 meses de tratamiento.

La dosis recomendada es de un comprimido de PIXAR® 2,5 mg dos veces al día, por ejemplo, un comprimido por la mañana y otro por la noche.

Su médico le indicará durante cuánto tiempo debe continuar el tratamiento.

Su médico puede cambiar su tratamiento anticoagulante tal como se indica a continuación:

- Cambio de PIXAR® o medicamentos anticoagulantes

Deje de tomar PIXAR® . Inicie el tratamiento con los medicamentos anticoagulantes (por ejemplo heparina) en el momento que le hubiera correspondido tomar el próximo comprimido.

- Cambio de medicamentos anticoagulantes de PIXAR®

Deje de tomar medicamentos anticoagulantes. Inicie el tratamiento con PIXAR® en el momento que tenga que tomar la próxima dosis de un medicamento anticoagulante, y entonces continúe con normalidad.

- Cambio de un tratamiento con anticoagulantes que contiene antagonistas de la Vitamina K (por ejemplo, Warfarina/acenocumarol) o PIXAR® .

Deje de tomar el medicamento que contiene un antagonista de la Vitamina K. Su médico necesitará realizarle análisis de sangre e indicarle cuándo empezar a tomar PIXAR® .

- Cambio del tratamiento con PIXAR® a un tratamiento anticoagulante que contiene un antagonista de la vitamina K (por ejemplo, Warfarina/acenocumarol).

Si su médico le indica que debe empezar a tomar un medicamento que contiene un antagonista de la vitamina K, continúe tomando PIXAR® durante al menos 2 días después de su primera dosis del medicamento que contiene un antagonista de la vitamina K. Su médico necesitará realizarle análisis de sangre e indicarle cuándo dejar de tomar PIXAR®.

Pacientes sometidos a cardioversión

Si su latido cardíaco necesita ser recuperado mediante un proceso llamado cardioversión, tome PIXAR® en los momentos que su médico le indique para prevenir coágulos de sangre en los vasos sanguíneos del cerebro y otros vasos sanguíneos del cuerpo.

Si toma más PIXAR® del que debe

Informe inmediatamente a su médico si ha tomado una dosis mayor que la dosis recetada de PIXAR®. Lleve el envase del medicamento a su médico, aunque no queden comprimidos.

Si toma más PIXAR® que la dosis recomendada, puede aumentar el riesgo de sangrado. Si ocurre una hemorragia, pueden ser necesarias una cirugía, transfusiones de sangre.

Si olvidó tomar PIXAR®

- Tome la dosis en cuanto se acuerde y:
- tome la siguiente dosis de PIXAR® a la hora habitual
- después, siga tomando el medicamento, como de costumbre

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico.

Si interrumpe el tratamiento con PIXAR®

NO INTERRUMPA EL TRATAMIENTO CON PIXAR® SIN HABLAR PRIMERO CON SU MÉDICO, PORQUE EL RIESGO DE DESARROLLAR UN COÁGULO DE SANGRE AUMENTA SI INTERRUMPE EL TRATAMIENTO

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, APIXABAN puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

APIXABAN puede administrarse en tres condiciones distintas. Los efectos adversos conocidos y la frecuencia con que se producen pueden ser distintos y por tanto se indican por separado a continuación. Para esas condiciones, el efecto adverso más frecuente de APIXABAN es el sangrado, que puede poner en peligro la vida del paciente y requiere atención médica inmediata.

Si usted presenta uno o más de los siguientes síntomas o eventos adversos, debe acudir de inmediato a su médico.

Los siguientes efectos adversos se han notificado cuando se tomó APIXABAN en la prevención de la formación de coágulos sanguíneos en las operaciones de reemplazo de cadera o rodilla.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- Anemia, que puede causar cansancio o palidez
- Sangrado que incluye:
 - o hematoma e hinchazón
- Náuseas (sensación de malestar)

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- Disminución del número de plaquetas en sangre (que puede afectar la coagulación)
- Sangrado:
 - o después de una operación, que incluye hematoma e hinchazón, secreción de sangre o líquido procedente de la herida/incisión quirúrgica (supuración) o del sitio de una inyección
 - o del estómago, el intestino o sangre brillante/roja en las heces
 - o sangre en la orina
 - o por la nariz
 - o por la vagina

- Presión arterial baja que puede producir desvanecimiento o latidos más rápidos del corazón.
- Los análisis de sangre pueden mostrar:
 - o función anormal del hígado
 - o aumento de algunas enzimas del hígado
 - o aumento de la bilirrubina, un producto derivado de los glóbulos rojos de la sangre, que puede causar coloración amarilla de la piel y los ojos.
- Picazón

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas)

- Reacciones alérgicas (hipersensibilidad) que pueden causar: hinchazón de la cara, labios, boca, lengua y/o garganta y dificultad para respirar. Informe a su médico inmediatamente si sufre cualquiera de estos síntomas:
- Sangrado:
 - o en un músculo
 - o en los ojos
 - o de las encías y tos con sangre
 - o del recto
- caída del pelo

Desconocidos (no pueden estimarse a partir de los datos disponibles)

- Sangrado:
 - o en el cerebro o médula espinal
 - o en los pulmones o garganta
 - o en la boca
 - o dentro del abdomen o dentro del espacio detrás de la cavidad abdominal
 - o de hemorroides
 - o pruebas que muestren sangre en orina o heces
- Erupción en la piel

Los siguientes efectos adversos se han notificado cuándo se toma APIXABAN para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en el corazón en pacientes con latido irregular del corazón y al menos un factor de riesgo adicional.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- Sangrado que incluye:
 - o sangre en los ojos
 - o sangrado del estómago, el intestino o sangre oscura/negra en las heces
 - o por el recto
 - o sangre en orina
 - o sangrado de la nariz
 - o sangre de las encías
 - o hematoma e hinchazón
- Anemia que puede producir cansancio o palidez
- Baja presión de la sangre que puede producir desmayos o aumento de los latidos del corazón
- Náusea (y mareos)
- estudios de sangre que pueden evidenciar:
 - o aumento de la gamma- glutamil transferasa

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- sangrado:
 - o en el cerebro o la columna espinal
 - o en la boca o tos con sangre
 - o en el abdomen o vagina
 - o sangre brillante/roja en las heces
 - o sangrado después de una operación que incluye hematoma e hinchazón, secreción de sangre o líquido procedente de la herida/incisión quirúrgica (supuración) o lugar de inyección
 - o de hemorroides
 - o estudios que evidencien sangre en heces u orina
- Reducción del número de plaquetas en sangre (que puede afectar la coagulación)
- Estudios de sangre que pueden mostrar

- función anormal del hígado
- aumento de algunas enzimas del hígado
- aumento de la bilirrubina, un producto de la ruptura de las células rojas de la sangre, que puede provocar coloración amarilla de la piel y los ojos
- Picazón
- Erupción en la piel
- Caída del cabello
- Reacciones alérgicas (hipersensibilidad) que pueden producir: hinchazón de la cara, labios, boca, lengua y/o garganta y dificultad para respirar. Contacte con su médico inmediatamente si experimenta alguno de estos síntomas.

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas)

- Sangrado:
 - en los pulmones o la garganta
 - dentro del espacio detrás de la cavidad abdominal
 - dentro del músculo

Los siguientes efectos adversos se han comunicado cuando se toma APIXABAN para tratar o prevenir que los coágulos de sangre vuelvan a producirse en las venas de las piernas y en los vasos sanguíneos de los pulmones.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- sangrado que incluye:
 - de la nariz
 - de las encías
 - sangre en la orina
 - hematoma e hinchazón
 - del estómago, del intestino o del recto
 - en la boca
 - de la vagina
- Anemia que puede provocar cansancio o palidez
- Reducción del número de plaquetas en sangre (que puede afectar la coagulación)
- Náusea (y mareos)
- Erupción cutánea.
- Estudios de sangre que pueden mostrar:
 - aumento de la gamma- glutamil transferasa o alanino aminotransferasa

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- Baja presión de la sangre que puede producir desmayos o aumento de los latidos del corazón
- Sangrado:
 - en los ojos
 - en la boca o tos con sangre
 - sangre brillante/roja en las heces
 - pruebas que muestran sangre en las heces o en la orina
 - sangrado después de una operación que incluye hematoma e hinchazón, secreción de sangre o líquido procedente de la herida/incisión quirúrgica (supuración) o lugar de inyección
 - de hemorroides
 - del interior del músculo
- Picazón
- Caída del cabello
- Reacciones alérgicas (hipersensibilidad) que pueden producir: hinchazón de la cara, labios, boca, lengua y/o garganta y dificultad para respirar. Contacte con su médico inmediatamente si experimenta alguno de estos síntomas.
- Pruebas de sangre que pueden mostrar:
 - función anormal del hígado
 - aumento de algunas enzimas del hígado
 - aumento de la bilirrubina, un producto de la ruptura de las células rojas de la sangre, que puede producir coloración amarilla de la piel y los ojos

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1de cada 1000 personas)

- sangrado:
 - o en el cerebro o en la médula espinal
 - o en los pulmones

Desconocidos (no pueden estimarse a partir de los datos disponibles)

- Sangrado:
 - o dentro del abdomen o dentro del espacio detrás de la cavidad abdominal

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Es importante que su médico notifique la sospecha de reacciones adversas, por tratarse de medicamentos de uso reciente.

SOBREDOSIFICACIÓN

No hay antídoto contra APIXABAN. Una sobredosis de apixaban puede aumentar el riesgo de sangrado. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-66481 4658-7777

PRESENTACIONES

PIXAR® 2,5 mg se presenta en envases que contienen 60 comprimidos recubiertos.

PIXAR® 5,0 mg se presenta en envases que contienen 60 comprimidos recubiertos.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C. Proteger de la luz y la humedad, en su envase original.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

No utilizar después de la fecha de vencimiento

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en lo Página Web de lo ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notfica.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

Especialidad Medicinal aprobada por el Ministerio de Salud – Certificado N°59823

Dirección Técnica: Farm. Sergio Omar Berrueta.

Elaborado por **EUROFARMA ARGENTINA S.A.**

Avda. Gral San Martín 4550, La Tablada. C.P.: B1751AAP.

Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Tel.: (54-11) 4003-6400.

Fecha última revisión: enero 2023